

AgroMet

Informe Agrometeorológico Semanal



AgroMet - INTA   




[Nuevo CANAL de WhatsApp](#)

<https://www.argentina.gob.ar/inta/informacion-agroclimatica/informes-agrometeorologicos/agromet-semanal>


https://sepa.inta.gob.ar/productos/indices_de_vegetacion/informes/index.php

ESTADO DEL TRIGO



En general, el trigo está en buen estado y con condiciones de humedad de suelo adecuadas. Los lotes implantados se encuentran entre emergencia y crecimiento vegetativo. En zonas de siembra temprana está iniciando el macollaje.

PRECIPITACIONES ACUMULADAS PRONOSTICADAS – 14 DÍAS



Se prevén lluvias y tormentas aisladas sobre el centro y noreste del país. Lluvias y nevadas de variada intensidad en la Patagonia y Cuyo (oeste). Los mayores acumulados se estiman en Buenos Aires (este) y Misiones (norte).



ESTADO DE LOS CULTIVOS*


TRIGO: se sembró el 96 % del área planificada. En el sudeste de Buenos Aires la siembra se encuentra demorada. En La Pampa avanza la siembra de ciclos cortos, con humedad de suelo regular a adecuada.

MAIZ: se cosechó el 86 % del área implantada. En el resto del área se aguarda la disminución de la humedad en el grano o las condiciones de piso favorables para el ingreso de la maquinaria.

*Fuente: Estimaciones Agrícolas, SAGyP. Actualizado al 24/07/2025.

ESTADO del ENSO

-0.2°C**




**Anomalía semanal (Niño 3.4). Actualizado el 28/07/25



Red AgroMet

PRECIPITACIÓN OBSERVADA



LO QUE PASÓ

23 al 29 de julio



LLUVIAS y TORMENTAS de variada intensidad sobre el NEA y el centro-este del país.




LLUVIAS Y NEVADAS de variada intensidad sobre toda la Patagonia; importantes acumulados sobre zonas cordilleranas.



TEMPERATURAS: se registraron mínimas elevadas y máximas bajas para la época sobre el centro y sur argentino.

PRECIPITACIÓN PRONOSTICADA SEMANAL



LO QUE VIENE

31 de julio al 5 de agosto



TEMPERATURAS ELEVADAS para la época en el centro y norte argentino.



LLUVIAS Y NEVADAS de variada intensidad en la Patagonia y Cuyo (oeste).



LLUVIAS y TORMENTAS aisladas sobre el centro y noreste del país.



IRRUPCIÓN DE AIRE FRÍO: heladas de variada intensidad sobre el centro y sur argentino hacia el fin de semana.



AGUA

5 [Precipitaciones](#)

6 [en el suelo](#)

TEMPERATURAS

7 [Máxima](#)

8 [Mínimas](#)

9 [Eventos extremos](#)

CULTIVOS

11 [Seguimiento](#)

PRONÓSTICO

12 [de Precipitaciones](#)

15 [de Temperatura
máxima](#)

16 [de Temperatura mínima](#)

17 [de heladas](#)

18 [de Ovinos](#)

CLIMA

19 [Tendencias](#)

EL CIERRE

21 [Toma de decisiones](#)

Instituto de Clima y Agua – CIRN

AUTORES


- Beget, María Eugenia
- D'Acunto, Luciana
- Espíndola, Aimé
- Gattinoni, Natalia
- Ramis, Vanesa
- Serritella, Dante Ariel
- Soria Mirlhen, María Luján

COLABORADORES


- Gusmerotti, Lucas
- Oricchio, Patricio
- Vallejos, Luis
- Red de Observadores INTA



23 al 30 de julio
a las 9:00 hs.



Precipitación acumulada en la última semana



Anomalía de la precipitación semanal

Durante la semana pasada se registraron precipitaciones sobre la mayor parte del territorio. Los acumulados más significativos ocurrieron en las provincias del Litoral con totales superiores a los 50 mm. En la Patagonia, se registraron lluvias y nevadas de variada intensidad con acumulados también superiores los 50 mm en el noroeste de la región.

En casi todo el NEA, en la reg. Pampeana (norte) y la Patagonia (centro y norte) dichos eventos superaron los valores normales para la época. Mientras que en el sur pampeano los acumulados fueron inferiores a los normales.

Acumulado semanal

Ciudad	Precipitación(mm)
Iguazú - SMN	88.0
Mercedes - INTA EMA	85.6
Mercedes - SMN	84.2
Bernardo de Irigoyen - SMN	83.7
Monte Caseros - SMN	83.1
Colonia Tabay - INTA EMA	70.8

Acumulado mensual



Ciudad	Precipitación(mm)
Bolivar - SMN	128.2
Rauch - INTA EMA	113.0
Monte Caseros - SMN	104.7
Concepción - INTA EMA	101.9
Tandil - SMN	101.5
Mercedes - INTA EMA	95.6

[Volver al índice](#)



Red AgroMet

20 de julio



Contenido de agua en el suelo

Variación del contenido de agua en el suelo

El modelo de balance hídrico, basado en información edafológica, climática y satelital, estima un contenido de agua útil en el perfil de suelo que varía entre el 50 % y el 90 %, con máximos que alcanzan el 100 % en amplias zonas de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además de zonas localizadas de Santa Fe (sureste) y La Pampa (noreste). En contraste, en el norte de Santa Fe y hacia el oeste del área relevada, los valores disminuyen considerablemente, con mínimos por debajo del 10 %.

En general, el contenido de agua útil disminuyó respecto al período decádico anterior, en hasta 30 mm en la casi toda el área. Mientras que, en Buenos Aires (noreste), Entre Ríos (este) y áreas de Corrientes, Córdoba y Santa Fe se registraron aumentos de hasta 30 mm respecto a dicho período.

El modelo estima el contenido de agua útil del suelo con respecto a su máxima capacidad de retención dependiendo de las condiciones edáficas y climáticas. Es importante destacar que el producto se encuentra en desarrollo y en fase experimental y puede ser consultado en <http://sepa.inta.gov.ar/productos/>


<https://sepa.inta.gov.ar/productos/>

[Volver al índice](#)




Red AgroMet

23 al 29 de julio



Temperaturas máximas medias de la última semana



Anomalías de las temperaturas máximas medias de la última semana

Durante la semana se registraron temperaturas máximas medias entre 14 y 22°C en el centro y norte del país, mientras que en el sector sur los valores oscilaron entre los 2 y 8 °C. Los mismos resultaron más fríos para la época, con valores hasta 6 °C inferiores a los valores históricos, en particular en Patagonia y en el centro-oeste del país.


En el mapa de la izquierda se destacan las localidades con las temperaturas máximas medias más altas (rojo) y más bajas (azul) del país.

Anomalías más cálidas y más frías


Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
La Quiaca - SMN	1.9	17.5
Bella Vista - INTA	1.6	21.6
Corrientes - INTA	0.9	20.9
Formosa - SMN	0.6	22.9
Trenque Lauquen - SMN	0.5	13.4
Salta - SMN	0.3	20.0

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Santiago del Estero - SMN	-6.0	15.4
Maquinchao - SMN	-5.9	0.7
Pilar - SMN	-5.4	11.7
Córdoba - SMN	-5.4	12.1
Paso de Indios - SMN	-5.1	4.9
La Rioja - SMN	-4.9	14.9

23 al 29 de julio



Temperaturas mínimas medias de la última semana



Anomalías de las temperaturas mínimas medias de la última semana

Las temperaturas mínimas medias de la semana alcanzaron valores entre los 2 y 14 °C sobre el centro y norte del país. Las mismas resultaron hasta 4 °C más cálidas que los promedios históricos para la época.

Los valores promedios en el sur del territorio fueron inferiores a los 0 °C y resultaron más fríos para la época.


En el mapa de la izquierda se destacan las localidades con las temperaturas mínimas medias más altas (rojo) y más bajas (azul) del país.

Anomalías más cálidas y más frías

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Famaillá - INTA	5.3	9.8
Salta - SMN	5.0	7.5
Las Lomitas - SMN	4.3	13.7
Corrientes - INTA	4.2	12.3
Santiago del Estero - SMN	3.9	8.3
Orán - SMN	3.7	12.2

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Cdoro. Rivadavia - SMN	-4.7	-1.3
Paso de Indios - SMN	-4.7	-6.7
Perito Moreno - SMN	-4.5	-6.5
Gdor. Gregores - SMN	-4.3	-6.4
San Julián - SMN	-3.4	-3.1
Puerto Deseado - SMN	-2.9	-2.3

23 al 29 de julio



Temperatura máxima extrema observada por localidad para el período


Durante la semana, las temperaturas máximas más altas alcanzaron valores entre los 18 y 26 °C en el oeste y norte del país.

No se registraron temperaturas superiores a los 30 °


Temperaturas extremas

Ciudad	Temperatura (°C)
Salta - SMN	30.4
Sta Victoria Oeste - INTA EMA	29.6
Tinogasta - SMN	29.5
Formosa - SMN	29.5
Las Lomitas - SMN	29.0
Jachal - SMN	28.5
Iguazú - SMN	28.4
Resistencia - SMN	27.8

23 al 29 de julio



Temperatura mínima extrema observada por localidad para el período



Cantidad de días con temperaturas inferiores a los 3°C

Las temperaturas mínimas extremas fueron inferiores a 0 °C en el sur de la reg. Pampeana y Cuyo. En la reg. patagónica, se registraron valores por debajo de los -4 °C hasta los 17 °C.


En reg. Pampeana se registraron valores inferiores a los 3 °C durante al menos 4 días. Y gran parte de la semana en Patagonia y oeste de Cuyo.

Esta información corresponde a temperaturas del aire registradas en abrigo meteorológico a 1.5 metros de altura. Es importante tener en cuenta que, a nivel del suelo, las temperaturas suelen ser aún más bajas.


Temperaturas extremas

Ciudad	Temperatura (°C)
Maquinchao - SMN	-17.7
Colan Conhué - INTA EMA	-14.5
Gdor. Gregores - SMN	-13.0
Perito Moreno - SMN	-12.5
Paso de Indios - SMN	-12.4
El Calafate - SMN	-11.9
Río Gallegos - SMN	-11.4
Ing. Jacobacci - INTA EMA	-10.6

24 de julio



Estado general del cultivo de trigo




Avance de la siembra de trigo


Maíz: el cultivo se encuentra en etapa de madurez en toda el área en donde aún no ha sido cosechado. La cosecha avanza lentamente y alcanza a cubrir el 86 % de la superficie cultivada a nivel nacional. Este valor es levemente inferior al registrado en la misma fecha de la campaña anterior.

Trigo: la siembra del cultivo alcanza el 96% de la superficie proyectada, un valor similar al registrado en igual fecha de la campaña anterior. El cultivo se encuentra entre las etapas de emergencia y crecimiento vegetativo.


Jueves 31




Viernes 1



Sábado 2



Domingo 3



Lunes 4




Martes 5





Lluvias y tormentas aisladas sobre el centro y noreste del país. Lluvias y nevadas de variada intensidad en la Patagonia y Cuyo (oeste).

Fuente: Análisis realizado del modelo GFS en el Inst. de Clima y Agua.



Mapas de precipitación
pronosticada acumulada diaria

Semana: 31 de julio al 5 de agosto





Mapas de precipitación pronosticada acumulada en mm (izquierda)
y su anomalía en porcentaje (derecha)

Dominaría la circulación del sector norte con paulatino ascenso de las temperaturas y valores elevados para la época sobre el centro y norte del país. Durante el viernes 1º un frente frío avanzaría sobre el centro y luego el norte del país con probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas. Posteriormente se prevé marcado descenso de las temperaturas con heladas de variada intensidad sobre el centro del país y sur del país.

En la Patagonia, se prevé abundante nubosidad con vientos intensos del sector sur. Hay probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad sobre toda la región; incluyendo Cuyo (oeste). Algunas podrían presentar importantes acumulados de agua/nieve y ráfagas.

Semana: 6 al 11 de agosto



Mapas de precipitación pronosticada acumulada en mm (izquierda) y su anomalía en porcentaje (derecha)


Al día de la fecha, el pronóstico prevé lluvias y chaparrones de variada intensidad sobre áreas del centro-este y noreste argentino.

Lluvias y nevadas sobre la Patagonia (oeste y norte).


PRONÓSTICO de temperaturas máximas

15


Jueves 31




Viernes 1




Sábado 2




Domingo 3



Lunes 4




Martes 5



Marcado ascenso de temperaturas sobre el centro y norte del país. Ambiente templado a cálido en el extremo norte del territorio.

Temperaturas estimadas a 2m del suelo.

Fuente: análisis realizado en el Inst. de Clima y Agua-INTA a partir del modelo GFS.



Mapas de temperatura máxima
diarias pronosticadas


<http://siga.inta.gob.ar/#/forecast>

[Volver al índice](#)


PRONÓSTICO de temperaturas mínimas

16


Jueves 31




Viernes 1




Sábado 2




Domingo 3



Lunes 4




Martes 5




Bajas temperaturas a partir del domingo 3.
Mínimas frescas a muy frías sobre la Patagonia.

Temperaturas estimadas a 2m del suelo.
Fuente: análisis realizado en el Inst. de Clima y Agua-INTA a partir del modelo GFS.




Mapas de temperatura mínima
diarias pronosticadas


Jueves 31




Viernes 1




Sábado 2




Domingo 3



Lunes 4



Martes 5



Heladas débiles en el centro del país (menores a -3°C) a partir del Lunes 4.

Heladas moderadas a intensas (menores a -6°C) en la Patagonia.

Temperaturas estimadas a 2m del suelo. Los valores en superficie podrían ser significativamente diferentes dependiendo de la orografía local.




Mapas de intensidad de heladas diarias pronosticadas.


PRONÓSTICO del enfriamiento para Ovinos

18


Jueves 31




Viernes 1





Sábado 2



Domingo 3



Lunes 4




Los ovinos recién esquilados y los neonatales son sensibles a las bajas temperaturas, al viento y a las precipitaciones. Pueden sufrir el síndrome hipotermia-inanición que determina una alta mortalidad en la majada. El índice de enfriamiento en ovinos se utiliza para determinar el riesgo de ocurrencia de este síndrome. Para el cálculo de este índice se utiliza la velocidad del viento, la temperatura ambiente y las precipitaciones previstas. Valores del índice superiores a 1000 kJ/m².h determinan riesgos de enfriamiento.

El pronóstico del índice busca orientar el manejo para disminuir los riesgos de ocurrencia del síndrome. Para su tratamiento se utilizan, entre otras estrategias, el suministro de reparos o la suplementación con alimentos energéticos.


<http://siga.inta.gob.ar/#/forecast>

[Volver al índice](#)

TRIMESTRE: agosto – septiembre – octubre de 2025



Pronóstico trimestral para precipitación



Pronóstico trimestral para temperaturas medias

La última actualización del pronóstico climático trimestral elaborado por el IRI prevé, para áreas del sur de reg. Pampeana, oeste de Cuyo, centro y norte de región Patagónica una mayor probabilidad de transitar un trimestre con lluvias entre **normales a inferiores** a las normales. En áreas de Cuyo, este pronóstico, le asigna una probabilidad de ocurrencia mayor al 50% a esta categoría.

Sobre el centro-norte y NOA las chances son de lluvias **normales a superiores** a las normales para la época.

En el caso de las temperaturas, se prevén valores medios para el trimestre **más cálidos** sobre todo el territorio nacional.


Las áreas en blanco indican que este pronóstico presenta incertidumbre en cuanto a la categoría que podrían presentar las variables durante el trimestre. **Se recomienda consultar los pronósticos a corto y mediano plazo.**

Esta información corresponde solo a un pronóstico climático estacional. En futuros informes complementaremos con la información generada por el SMN.

Actualizado: 15/07/2024

<https://iri.columbia.edu/>

[Volver al índice](#)




Probabilidad de ocurrencia de cada fase del fenómeno ENSO a partir de los modelos de pronóstico internacionales

Estado actual del ENOS: **NEUTRAL**.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur se encuentra en fase Neutral, condición que se mantendría durante el invierno, con una probabilidad estimada entre el 60 % y el 85 % (barras grises del gráfico superior). Tanto los modelos estadísticos como los dinámicos coinciden en que esta fase continuaría durante la primera parte de la primavera de 2025.

Para la temporada primavera-verano, las probabilidades siguen favoreciendo la persistencia de la fase Neutral. Sin embargo, aumenta la probabilidad de evolución hacia una fase La Niña (barras azules) alcanzando probabilidades similares a la Neutralidad. Continúan siendo bajas probabilidades para la ocurrencia de la fase El Niño.

Será necesario consultar mensualmente las actualizaciones de la información de pronósticos para conocer cómo evolucionará este fenómeno y el posible comportamiento estacional de lluvias y de las temperaturas.



<https://iri.columbia.edu/>

[Volver al índice](#)

PRECIPITACIONES

Lluvias y tormentas aisladas sobre el centro y noreste del país. Lluvias y nevadas de variada intensidad en la Patagonia y Cuyo (oeste).

TEMPERATURAS

Marcado ascenso de temperaturas sobre el centro y norte del país; valores elevados para la época en el extremo norte del territorio hasta el sábado 2. Irrupción de aire frío a partir del viernes 1°. Heladas débiles en el centro del país (menores a -3°C). Heladas moderadas a intensas (menores a -6°C) en la Patagonia.

ENSO

El fenómeno se encuentra en su fase **Neutral**. Existe una probabilidad de entre el 60 y 85 % de continuar en neutralidad el presente invierno.

Se recomienda consultar la actualización de este pronóstico, los pronósticos a corto plazo y los trimestrales para conocer el posible comportamiento de las lluvias y las temperaturas.

FUENTES



Red AgroMet

Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Facultad de Agronomía (FAUBA).

Dirección de Estimaciones Agrícolas (DEA) - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Modelo Meteorológico GFS del COLA-IGES, USA.

CPC-NCEP/NOAA, IRI.