

AgroMet

Informe Agrometeorológico Semanal



AgroMet - INTA   




[Nuevo CANAL de WhatsApp](#)

<https://www.argentina.gob.ar/inta/informacion-agroclimatica/informes-agrometeorologicos/agromet-semanal>


https://sepa.inta.gob.ar/productos/indices_de_vegetacion/informes/index.php

HELADAS



Se registraron temperaturas en superficie inferiores a -3°C en gran parte de centro y sur del territorio. En sectores de Cuyo y Patagonia, los valores descendieron por debajo de los -8°C . En el norte-centro del país se registraron áreas con temperaturas en superficie entre -3 y -6°C .

PRECIPITACIONES ACUMULADAS PRONOSTICADAS – 14 DÍAS



El pronóstico prevé, para la primera semana, lluvias y tormentas aislados sobre Cuyo y reg. Pampeana (oeste). Lluvias y nevadas aisladas en la Patagonia (noroeste) y Cuyo (oeste). Para la segunda semana, lluvias y tormentas de variada intensidad sobre la mayor parte del centro y norte del país.




ESTADO DE LOS CULTIVOS*

Trigo: la siembra del cereal presenta un avance cercano al 100% de la superficie proyectada. En general, el cultivo se encuentra finalizando la etapa de crecimiento vegetativo, excepto en Buenos Aires y La Pampa, donde aún se observan lotes entre emergencia y crecimiento.

Maíz: el cultivo se encuentra en etapa de madurez en toda el área en donde aún no ha sido cosechado. La cosecha avanza lentamente y alcanza a cubrir el 92 % de la superficie a nivel nacional. Este valor es levemente inferior al registrado en la misma fecha de la campaña anterior.

ESTADO del ENSO


$-0.3^{\circ}\text{C}^{**}$



** Anomalia semanal (Niño 3.4).
Actualizado el 11/08/25

*Fuente: Estimaciones Agrícolas, SAGyP. Actualizado al 7/8/2025.

PRECIPITACIÓN OBSERVADA



LO QUE PASÓ

5 al 11 de agosto



LLUVIAS y TORMENTAS aisladas sobre el NOA, Corrientes y Misiones.




LLUVIAS Y NEVADAS de variada intensidad sobre la Patagonia (centro y oeste) y Mendoza (oeste).



HELADAS agrometeorológicas en gran parte del país. Sin embargo, las temperaturas medias fueron más cálidos en el centro y sur argentino.

PRECIPITACIÓN PRONOSTICADA SEMANAL



LO QUE VIENE

13 al 18 de agosto



INGRESO DE AIRE FRÍO: heladas débiles sobre el centro y moderadas en el sur argentino



LLUVIAS Y NEVADAS aisladas en la Patagonia (noroeste) y Cuyo (oeste).



LLUVIAS y CHAPARRONES aislados sobre Cuyo y reg. Pampeana (oeste).

AGUA

5 [Precipitaciones](#)

6 [en el suelo](#)

TEMPERATURAS

7 [Máxima](#)

8 [Mínimas](#)

9 [Eventos extremos](#)

CULTIVOS

12 [Seguimiento](#)

PRONÓSTICO

13 [de Precipitaciones](#)

16 [de Temperatura
máxima](#)

17 [de Temperatura mínima](#)

18 [de heladas](#)

19 [de Ovinos](#)

CLIMA

20 [Tendencias](#)

EL CIERRE

22 [Toma de decisiones](#)

Instituto de Clima y Agua – CIRN

AUTORES


- Beget, María Eugenia
- D'Acunto, Luciana
- Espíndola, Aimé
- Gattinoni, Natalia
- Ramis, Vanesa
- Serritella, Dante Ariel
- Soria Mirlhen, María Luján

COLABORADORES


- Gusmerotti, Lucas
- Oricchio, Patricio
- Vallejos, Luis
- Red de Observadores INTA



5 al 12 de agosto
a las 9:00 hs.



Precipitación acumulada en la última semana



Anomalía de la precipitación semanal

Durante la semana pasada se registraron precipitaciones sobre diversas áreas del país. Los eventos registrados fueron, en general, de bajos acumulados. Los registros mas altos se observaron en Patagonia (noroeste) con totales para el período de entre 30 mm y 46 mm.

Estas lluvias, y otras de menores acumulados registradas en el NOA, fueron superiores a los valores normales para la época. Mientras que, en el resto del país los acumulados fueron entre normales e inferiores a los normales, particularmente en áreas extensas de las regiones Pampeana y del NEA.

Acumulado semanal

Ciudad	Precipitación(mm)
El Bolsón - SMN	46.0
Bariloche - SMN	31.0
Chapelco - SMN	30.2
Esquel - SMN	30.0
Orán - SMN	15.3
Malargüe - SMN	15.0

Acumulado mensual



Ciudad	Precipitación(mm)
El Bolsón - SMN	61.5
Iguazú - SMN	58.0
Posadas - SMN	53.0
Esquel - SMN	41.0
Bariloche - SMN	38.9
Bernardo de Irigoyen - SMN	36.2

[Volver al índice](#)



Red AgroMet

31 de julio



Contenido de agua en el suelo

Variación del contenido de agua en el suelo

El modelo de balance hídrico, basado en información edafológica, climática y satelital, estima un contenido de agua útil en el perfil de suelo que varía entre el 50 % y el 90 %, con máximos que alcanzan el 100 %, en amplias zonas de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe (sur), La Pampa, Córdoba (suroeste) y Buenos Aires. Además, en zonas localizadas de Santa Fe (sureste) y La Pampa (noreste). Por el contrario, en el norte de Santa Fe, suroeste de Buenos Aires y hacia el oeste del área relevada, los valores disminuyen considerablemente, con mínimos por debajo del 10 %.

En general, el contenido de agua útil disminuyó, respecto al período decádico anterior, en hasta 30 mm en el oeste y zonas del centro del área relevada. Mientras que, en La Pampa (oeste), Buenos Aires (sureste), Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe (norte y sur), Córdoba (centro-este), Santiago del Estero (sur y centro-este), Chaco (sur y este) y Formosa (este) se registraron aumentos de hasta 30 mm respecto a dicho período.

El modelo estima el contenido de agua útil del suelo con respecto a su máxima capacidad de retención dependiendo de las condiciones edáficas y climáticas. Es importante destacar que el producto se encuentra en desarrollo y en fase experimental y puede ser consultado en <http://sepa.inta.gov.ar/productos/>


<https://sepa.inta.gov.ar/productos/>

[Volver al índice](#)




Red AgroMet

5 al 11 de agosto



Temperaturas máximas medias de la última semana



Anomalías de las temperaturas máximas medias de la última semana

Durante la semana se registraron temperaturas máximas medias entre 14 y 23 °C en el centro y norte del país. En Patagonia sur, los valores oscilaron entre los 6 y 18 °C.

Estos valores resultaron más cálidos para la época sobre la mayor parte del centro y sur territorio. La excepción fue en el extremo norte del país donde se registraron temperaturas inferiores a las esperadas.


En el mapa de la izquierda se destacan las localidades con las temperaturas máximas medias más altas (rojo) y más bajas (azul) del país.

Anomalías más cálidas y más frías


Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Maquinchao - SMN	5.3	12.5
Río Colorado - SMN	4.8	19.9
Santa Rosa - SMN	4.4	19.5
Neuquén - SMN	4.1	18.1
Trelew - SMN	3.9	17.2
Victorica - SMN	3.7	20.1

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Formosa - SMN	-4.9	18.6
Cerro Azul - INTA	-4.4	17.7
Mercedes - INTA	-4.4	17.0
Posadas - SMN	-3.8	19.2
Bernardo de Irigoyen - SMN	-3.7	17.0
Iguazú - SMN	-3.5	19.9

5 al 11 de agosto



Temperaturas mínimas medias de la última semana



Anomalías de las temperaturas mínimas medias de la última semana

Las temperaturas mínimas medias de la semana alcanzaron valores entre los 2 y 10 °C sobre el centro y norte del país, y fueron inferiores a los 4 °C sobre toda la Patagonia.

Estos valores resultaron más fríos que los promedios históricos para la época sobre el NEA y el centro-este. En cambio, en el oeste y sur del territorio las temperaturas fueron más cálidas.


En el mapa de la izquierda se destacan las localidades con las temperaturas mínimas medias más altas (rojo) y más bajas (azul) del país.

Anomalías más cálidas y más frías

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Tinogasta - SMN	2.6	3.2
Neuquén - SMN	2.6	3.0
Río Grande - SMN	2.6	0.7
Paso de Indios - SMN	2.6	1.4
San Rafael - SMN	2.4	3.7
Catamarca - SMN	2.2	7.9

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Concordia - SMN	-4.9	3.2
Morón - SMN	-4.6	3.5
Monte Caseros - SMN	-4.3	4.9
Cerro Azul - INTA	-4.0	7.9
Reconquista - INTA	-3.9	4.7
Reconquista - SMN	-3.7	5.6

5 al 11 de agosto



Temperatura máxima extrema observada por localidad para el período


Durante la semana, las temperaturas máximas más altas alcanzaron valores entre los 18 y 27 °C en el centro y norte del país. En la Patagonia noreste resultaron superiores a los 22 °C.

No se registraron temperaturas superiores a los 30 °C.


Temperaturas extremas

Ciudad	Temperatura (°C)
Rivadavia - SMN	27.0
Río Colorado - SMN	26.8
Las Lomitas - SMN	26.4
Catamarca - SMN	26.4
Santa Rosa - SMN	26.3
Hornillos - INTA EMA	26.3
General Pico - SMN	26.0
Villa Reynolds - SMN	26.0

5 al 11 de agosto



Temperatura mínima extrema observada por localidad para el período



Cantidad de días con temperaturas inferiores a los 3°C

Las temperaturas mínimas extremas fueron inferiores a 0 °C sobre gran parte del territorio. En la Patagonia se registraron valores entre los -2 y los -8.4 °C.


En todas las provincias del país se registraron temperaturas inferiores a los 3 °C durante al menos un día. En la Patagonia y la porción centro, estas condiciones se extendieron a lo largo de gran parte de la semana.

Las temperaturas corresponden al valor del aire en el abrigo meteorológico a 1.5 metros. A nivel del suelo, las temperaturas suelen ser aún más bajas.


Temperaturas extremas

Ciudad	Temperatura (°C)
Maquinchao - SMN	-8.4
Villa Reynolds - SMN	-8.2
La Quiaca - SMN	-7.8
Ing. Jacobacci - INTA EMA	-6.7
Río Colorado - SMN	-6.4
Colan Conhué - INTA EMA	-5.5
Santa Rosa de Conlara - SMN	-5.4
Jachal - SMN	-5.1
El Calafate - SMN	-5.1


7 de agosto




8 de agosto



9 de agosto





10 de agosto



Temperatura de superficie registrada por GOES-19 a las 6am.
https://sepa.inta.gob.ar/productos/eventos_extremos/heladas/

Se registraron temperaturas en superficie inferiores a -3°C en gran parte de centro y sur del territorio. En sectores de Cuyo y Patagonia, los valores descendieron por debajo de los -8°C . En el norte-centro del país se registraron áreas con temperaturas en superficie entre -3 y -6°C .

7 de agosto




Estado general del cultivo de trigo

Avance de la siembra de trigo


Trigo: la siembra del cereal presenta un avance cercano al 100% de la superficie proyectada. Solo quedan lotes por sembrar en Buenos Aires (centro y sureste) y Chaco (este). En general, el cultivo se encuentra finalizando la etapa de crecimiento vegetativo, excepto en Buenos Aires y La Pampa, donde aún se observan lotes entre emergencia y crecimiento.

Maíz: el cultivo se encuentra en etapa de madurez en toda el área en donde aún no ha sido cosechado. La cosecha avanza lentamente y alcanza a cubrir el 92 % de la superficie a nivel nacional. Este valor es levemente inferior al registrado en la misma fecha de la campaña anterior.


Miércoles 13




Jueves 14




Viernes 15




Sábado 16



Domingo 17




Lunes 18





Lluvias y chaparrones aislados sobre Cuyo y reg. Pampeana (oeste). Lluvias y nevadas aisladas en la Patagonia (noroeste) y Cuyo (oeste).

Fuente: Análisis realizado del modelo GFS en el Inst. de Clima y Agua.



Mapas de precipitación
pronosticada acumulada diaria

Semana: 13 al 18 de agosto





Mapas de precipitación pronosticada acumulada en mm (izquierda)
y su anomalía en porcentaje (derecha)

Durante el jueves 14 se prevé el ingreso de un pulso frío sobre el sur y centro del país. Habría marcado descenso de las temperaturas, vientos del sector sur y probabilidad de algunas lluvias y chaparrones aislados sobre el centro del país. Hasta el sábado 16 se podrían registrar algunas heladas agronómicas y/o heladas débiles en el centro argentino.

En la Patagonia, hasta el sábado 16 permanecería el tiempo frío con heladas de variada intensidad en gran parte de la región. Entre el viernes 15 y el lunes 18 se presentaría tiempo inestable sobre el norte patagónico y cuyano con probabilidad de algunas lluvias y nevadas aisladas.

Semana: 19 al 24 de agosto



Mapas de precipitación pronosticada acumulada en mm (izquierda)
y su anomalía en porcentaje (derecha)


Al día de la fecha, el pronóstico prevé lluvias y tormentas de variada intensidad sobre la mayor parte del centro y norte del país.

Lluvias y nevadas aisladas sobre la Patagonia (oeste y sur).


PRONÓSTICO de temperaturas máximas

16


Miércoles 13




Jueves 14




Viernes 15




Sábado 16



Domingo 17




Lunes 18




Temperaturas en ascenso a partir del sábado 16.
Ambiente templado a cálido en el extremo norte del territorio.

Temperaturas estimadas a 2m del suelo.
Fuente: análisis realizado en el Inst. de Clima y Agua-INTA a partir del modelo GFS.




Mapas de temperatura máxima
diarias pronosticadas


Miércoles 13




Jueves 14




Viernes 15




Sábado 16



Domingo 17



Lunes 18




Ambiente frío a fresco en el centro y sur del país hasta el sábado 16.

Mínimas frías con temperaturas en ascenso en la Patagonia.


Temperaturas estimadas a 2m del suelo.

Fuente: análisis realizado en el Inst. de Clima y Agua-INTA a partir del modelo GFS.




Mapas de temperatura mínima
diarias pronosticadas


Miércoles 13




Jueves 14




Viernes 15




Sábado 16



Domingo 17



Lunes 18



Heladas agrometeorológicas (menores a 3°C) y/o débiles en el centro del país (menores a -3 °C).
Heladas moderadas a intensas (menores a -6 °C) en la Patagonia.

Temperaturas estimadas a 2m del suelo. Los valores en superficie podrían ser significativamente diferentes dependiendo de la orografía local.




Mapas de intensidad de heladas diarias pronosticadas.


PRONÓSTICO del enfriamiento para Ovinos

19


Miércoles 13




Jueves 14






Viernes 15



Sábado 16



Domingo 17




Los ovinos recién esquilados y los neonatales son sensibles a las bajas temperaturas, al viento y a las precipitaciones. Pueden sufrir el síndrome hipotermia-inanición que determina una alta mortalidad en la majada. El índice de enfriamiento en ovinos se utiliza para determinar el riesgo de ocurrencia de este síndrome. Para el cálculo de este índice se utiliza la velocidad del viento, la temperatura ambiente y las precipitaciones previstas. Valores del índice superiores a 1000 kJ/m².h determinan riesgos de enfriamiento.

El pronóstico del índice busca orientar el manejo para disminuir los riesgos de ocurrencia del síndrome. Para su tratamiento se utilizan, entre otras estrategias, el suministro de reparos o la suplementación con alimentos energéticos.

<http://siga.inta.gob.ar/#/forecast>

[Volver al índice](#)

TRIMESTRE: agosto – septiembre – octubre de 2025




Pronóstico trimestral para precipitación

Precipitaciones:

Se prevé un trimestre más húmedo de lo normal en la reg. Pampeana (norte) y la mayor parte del norte argentino. Un trimestre normal en el sur del país; y más seco que lo normal en la Patagonia (noroeste) y Cuyo (oeste). Estación seca en el extremo noroeste.

No se asigna pronóstico para las provincias de La Pampa y Buenos Aires.




Pronóstico trimestral para temperaturas medias

Temperaturas:

Se prevé un trimestre entre normal a más cálido de lo normal sobre gran parte del país. Mayor probabilidad de un trimestre cálido en la Patagonia, Córdoba y Cuyo (oeste y sur).

Actualizado: 31/07/2025

Pronóstico climático trimestral por consenso elaborado por el SMN. Se recomienda consultar los pronósticos a corto y mediano plazo para complementar esta información.



Actualizado: 11/08/2025


Evolución de la anomalía trimestral observada y pronosticada, por distintos modelos, de la temperatura de la superficie del mar (°C) en el Océano Pacífico Ecuatorial en la región Niño 3.4.

Estado actual del ENOS: **NEUTRAL**.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur se encuentra actualmente en fase Neutral, condición que se mantendría durante lo que resta del invierno. En las últimas semanas, se ha observado un enfriamiento progresivo de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial. Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, los modelos climáticos muestran una mayor probabilidad de transición hacia una fase La Niña, aunque se trataría de un evento débil y de corta duración. A partir del verano 2025/26, la mayoría de los modelos proyectan un nuevo calentamiento del Pacífico ecuatorial, lo que aumenta la probabilidad de un retorno a condiciones Neutrales.

Estas proyecciones deben tomarse con cautela debido a la incertidumbre estacional característica de los modelos en esta época del año.

Será necesario consultar mensualmente las actualizaciones de la información de pronósticos para conocer cómo evolucionará este fenómeno y el posible comportamiento estacional de lluvias y de las temperaturas.



<https://iri.columbia.edu/>

[Volver al índice](#)

PRECIPITACIONES

Lluvias y tormentas con chaparrones aislados sobre Cuyo y reg. Pampeana (oeste). Lluvias y nevadas aisladas en la Patagonia (noroeste) y Cuyo (oeste).

TEMPERATURAS

Ingreso de aire frío a partir del jueves 14. Heladas agrometeorológicas (menores a 3°C) y/o débiles (menores a -3 °C) en el centro del país. Heladas moderadas a intensas (menores a -6 °C) en la Patagonia. Temperaturas en ascenso a partir del domingo 17.

ENSO

El fenómeno se encuentra en su fase **Neutral**. Existe una probabilidad de entre el 60 y 85 % de continuar en neutralidad durante el invierno.

Se recomienda consultar la actualización de este pronóstico, los pronósticos a corto plazo y los trimestrales para conocer el posible comportamiento de las lluvias y las temperaturas.

FUENTES



Red AgroMet

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
- Facultad de Agronomía (FAUBA).
- Dirección de Estimaciones Agrícolas (DEA) - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Modelo Meteorológico GFS del COLA-IGES, USA.
- CPC-NCEP/NOAA, IRI.