

AgroMet

Informe Agrometeorológico Semanal



AgroMet - INTA 🇦🇷 🌱 ☁️




[Nuevo CANAL de WhatsApp](#)

<https://www.argentina.gob.ar/inta/informacion-agroclimatica/informes-agrometeorologicos/agromet-semanal>


https://sepa.inta.gob.ar/productos/indices_de_vegetacion/informes/index.php

PRONÓSTICO TRIMESTRAL DE PRECIPITACIONES (OCT-NOV-DIC)



Para el próximo trimestre se prevén precipitaciones acumuladas inferiores a lo normal en el Litoral y el noroeste de la Patagonia, mientras que en el noroeste del país se esperan valores normales a superiores a lo normal. En el resto del territorio, las precipitaciones se ubicarían dentro de los valores normales.

PRONÓSTICO SEMANAL DEL ÍNDICE DE ENFRIAMIENTO OVINO



Esta semana se estiman condiciones meteorológicas predisponentes que resultarían en un riesgo de enfriamiento ovino crítico en el este de la región Pampeana y Patagonia.



ESTADO DE LOS CULTIVOS*


Trigo: el cultivo continúa en buena condición general, en etapas entre macollaje y encañazón. Persisten anegamientos en zonas bajas y se registran focos de roya en algunas áreas puntuales.

Girasol: se sembró el 26 % del área de intención de siembra. Los lotes implantados muestran buen estado general.

Maíz: la siembra alcanza el 12 % del área nacional, continúa demorada en algunas áreas debido a las lluvias y los excesos hídricos. Los lotes implantados presentan buen estado general.


ESTADO del ENSO

-0.5°C**



**Anomalía semanal (Niño 3.4).
Actualizado el 29/09/25

PRECIPITACIÓN OBSERVADA



LO QUE PASÓ

24 al 30 de septiembre



LLUVIAS y TORMENTAS sobre el centro y noreste del país. Algunas superaron los 100 mm en Corrientes. Lluvias y nevadas en Patagonia (oeste y sur).




HELADAS agrometeorológicas en Cuyo, Bs. As. y la Patagonia.



TEMPERATURAS MÁXIMAS extremas que casi alcanzaron los 40 °C en el centro-norte del país.

PRECIPITACIÓN PRONOSTICADA SEMANAL



LO QUE VIENE

2 al 7 de octubre



LLUVIAS y TORMENTAS de variada intensidad sobre el centro-este y noreste del país.



TEMPERATURAS MÁXIMAS superarían los 38 °C en el norte del país.



HELADA agrometeorológica (menor a 3 °C) en Bs. As. Heladas débiles a moderadas en Patagonia.



LLUVIAS Y NEVADAS aisladas en la Patagonia (centro y sur).



AGUA

5 [Precipitaciones](#)

6 [en el suelo](#)



TEMPERATURAS

8 [Máxima](#)

9 [Mínimas](#)

10 [Eventos extremos](#)



CULTIVOS

12 [Seguimiento](#)



PRONÓSTICO

13 [de Precipitaciones](#)

15 [de Temperatura
máxima](#)

16 [de Temperatura mínima](#)

17 [de heladas](#)

18 [de Ovinos](#)



CLIMA

19 [Tendencias](#)



EL CIERRE

22 [Toma de decisiones](#)

Instituto de Clima y Agua – CIRN

AUTORES

Beget, María Eugenia

D'Acunto, Luciana

Espíndola, Aimé

Gattinoni, Natalia

Ramis, Vanesa

Serritella, Dante Ariel

Soria Mirlhen, María Luján

COLABORADORES


Gusmerotti, Lucas

Oricchio, Patricio


Vallejos, Luis

Red de Observadores INTA

24 de septiembre al 1 de octubre
a las 9:00 hs.



Precipitación acumulada en la última semana



Anomalía de la precipitación semanal

Durante la semana pasada, las precipitaciones más importantes se registraron en las regiones Pampeana y del NEA. En estas áreas se acumularon entre 79 y 139 mm, siendo este ultimo valor el registrado en la provincia de Misiones (suroeste).

Estos eventos, y otros de menores acumulados observados en el centro de la región Pampeana, fueron superiores a los esperados para la época. En el resto del país, resultaron normales a inferiores a lo normal,



Acumulado semanal

Ciudad	Precipitación(mm)
Posadas - SMN	139.0
Resistencia - SMN	101.6
Corrientes - INTA EMA	99.6
Corrientes - INTA	98.0
Corrientes - SMN	83.0
Cerro Azul - INTA	79.7

Acumulado mensual septiembre

Ciudad	Precipitación(mm)
Posadas - SMN	354.0
Cerro Azul - INTA	284.9
Paso de los Libres - SMN	220.1
Resistencia - SMN	194.6
Oberá - SMN	186.0
Corrientes - INTA EMA	173.4

20 de septiembre



Contenido de agua en el suelo

El modelo estima niveles de agua útil en el suelo entre 50% y 90%, con máximos cercanos al 100% en gran parte de Buenos Aires, La Pampa (centro y este), Córdoba (este), Santa Fe (centro y sur), San Luis (centro) Entre Ríos, Corrientes, Chaco (sur) y Formosa (este).

En contraste, los valores son muy bajos (menores al 10%) en el norte de Santa Fe, el suroeste bonaerense y el oeste del área analizada.


Respecto a la década anterior, se registraron aumentos en la humedad del suelo en la mayor parte del área informada.

Variación del contenido de agua en el suelo

El modelo, basado en información edafológica, climática y satelital, estima el contenido de agua útil del suelo con respecto a su máxima capacidad de retención dependiendo de las condiciones edáficas y climáticas. Es importante destacar que el producto se encuentra en desarrollo y en fase experimental y puede ser consultado en <http://sepa.inta.gob.ar/productos/>

<https://sepa.inta.gob.ar/productos/>

1 de octubre




Agua excedente.

Los principales excedentes se observan en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos (norte) y Corrientes, con valores de entre 40 y 80 mm.


Además, se registran excedentes de menor magnitud en zonas localizadas de Santa Fe (noreste y sur) y La Pampa (centro)

Representa la lámina de agua que excede la capacidad de retención hídrica del suelo. Cuando las precipitaciones superan la evapotranspiración, y se sobrepasa la capacidad de almacenamiento en el perfil, se genera un excedente cuya magnitud es la que muestra este producto. El modelo de simulación asume que todo el excedente se pierde del sistema. No obstante, en la realidad este excedente puede contribuir a la recarga de la napa freática (según la profundidad a la que se encuentre), escurrir hacia zonas bajas, acumularse en lagunas cercanas o incorporarse a cursos de agua que lo transporten hacia aguas abajo en la cuenca. El indicador de Agua Excedente refleja la posible ocurrencia de estos procesos en un período decadal determinado. Es importante destacar que el producto se encuentra en desarrollo y en fase experimental.

24 al 30 de septiembre



Temperaturas máximas medias de la última semana



Anomalías de las temperaturas máximas medias de la última semana

Durante la semana se registraron temperaturas máximas medias entre 22 y 32 °C en el centro y norte del país. En Buenos Aires y Patagonia los valores estuvieron entre los 14 y 22 °C.

Estas temperaturas resultaron más cálidas para la época en gran parte del país. Los desvíos más importantes estuvieron entre los 3 y 6 °C con respecto a los valores históricos.


En el mapa de la izquierda se destacan las localidades con las temperaturas máximas medias más altas (rojo) y más bajas (azul) del país.

Anomalías más cálidas y más frías


Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Jachal - SMN	6.7	27.4
Tucumán - SMN	4.8	30.5
Santiago del Estero - SMN	4.7	32.1
Tinogasta - SMN	4.7	30.7
Codoro. Rivadavia - SMN	4.7	21.5
Malargüe - SMN	4.6	21.6

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Benito Juárez - SMN	-0.2	17.1
Dolores - SMN	-0.2	18.2
Azul - SMN	-0.1	18.0
Bariloche - SMN	0.0	13.4
Las Flores - SMN	0.2	19.0
Bolivar - SMN	0.2	19.3

24 al 30 de septiembre



Temperaturas mínimas medias de la última semana



Anomalías de las temperaturas mínimas medias de la última semana

Las temperaturas mínimas medias alcanzaron valores entre los 8 y 16 °C sobre el centro y norte del país. Mientras que, en el sur se registraron temperaturas inferiores a los 8 °C.

Estos valores resultaron hasta 3 °C más cálidos que los promedios históricos para la época en gran parte del país.


En el mapa de la izquierda se destacan las localidades con las temperaturas mínimas medias más altas (rojo) y más bajas (azul) del país.

Anomalías más cálidas y más frías


Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Bariloche - SMN	3.8	3.9
La Quiaca - SMN	3.5	3.8
El Bolsón - SMN	3.2	5.0
Paso de Indios - SMN	3.2	5.0
Esquel - SMN	3.0	3.8
Las Flores - SMN	2.9	9.5

Ciudad	Anomalía (°C)	Temperatura (°C)
Colonia Benitez - INTA	-0.8	12.8
Córdoba - SMN	-0.6	8.7
Morón - SMN	-0.5	10.5
Salta - SMN	-0.4	8.3
La Plata - SMN	-0.3	8.2
Reconquista - SMN	-0.2	12.3

24 al 30 de septiembre



Temperatura máxima extrema observada por localidad para el período



Cantidad de días con temperaturas mayores a los 30°C

Las temperaturas máximas más altas alcanzaron valores entre los 30 y 38 °C en el norte del país.


En Patagonia resultaron entre los 15 y 26 °C.

Se registraron entre 1 a 7 días con temperaturas superiores a los 30 °C en localidades del norte argentino.


Temperaturas extremas

Ciudad	Temperatura (°C)
Rivadavia - SMN	39.5
Quimilí - INTA EMA	38.0
Orán - SMN	37.5
Las Lomitas - SMN	37.2
Tartagal - SMN	37.0
Tinogasta - SMN	36.6
Los Juríes - INTA EMA	35.8
Malbrán - INTA EMA	35.6

24 al 30 de septiembre



Temperatura mínima extrema observada por localidad para el período



Cantidad de días con temperaturas inferiores a los 3°C

Las temperaturas mínimas más bajas fueron inferiores a 0 °C en Patagonia. En el centro del país los valores estuvieron entre los 2 y 6 °C.


Se registraron entre 1 y 4 días con temperaturas inferiores a los 3°C en la región Pampeana, Cuyo y Patagonia.

Los valores corresponden a la temperatura mínima del aire registrada en el abrigo o casilla meteorológica a 1.5 metros de altura. A nivel del suelo, las temperaturas pueden ser aún más bajas.


Temperaturas extremas

Ciudad	Temperatura (°C)
Río Grande - SMN	-4.0
Maquinchao - SMN	-3.0
Trelew - SMN	-3.0
Viedma - SMN	-2.9
Paso de Indios - SMN	-2.6
El Calafate - SMN	-2.6
Tandil - SMN	-2.0
Malargüe - SMN	-1.6
Cdoro. Rivadavia - SMN	-1.6
Ing. Jacobacci - INTA EMA	-1.6

25 de septiembre



Estado general del cultivo de trigo




Avance de la siembra de girasol

Trigo: la mayor parte del área implantada se encuentra en etapa de crecimiento vegetativo. En la región centro y norte del país se observan lotes entre floración y llenado de granos. En términos generales, el estado del cultivo es bueno.


Girasol: la siembra continúa en el norte y, en menor medida, en el centro del país. Los mayores avances se observan en Santa Fe (centro y norte), Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero. En la provincia de Chaco, la siembra ya finalizó.

Maíz: continúa la siembra del cereal, principalmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Se espera, para acelerar las labores, que las temperaturas sean mas elevadas y, en algunas zonas, que mejoren las condiciones de piso.


Jueves 2




Viernes 3




Sábado 4




Domingo 5



Lunes 6




Martes 7





Lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro-este y noreste del país. Lluvias y nevadas aisladas en la Patagonia (centro y sur).

Fuente: Análisis realizado del modelo GFS en el Inst. de Clima y Agua.





Mapas de precipitación
pronosticada acumulada diaria

Semana: 2 al 7 de octubre



Semana: 8 al 13 de octubre



Mapas de precipitación pronosticada acumulada en mm (izquierda) y su anomalía en porcentaje (derecha).


Para los próximos 14 días se prevé acumulados de variada intensidad sobre gran parte del centro y norte del territorio. Algunas podrían ser con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo. Habría lluvias y nevadas aisladas en la Patagonia (centro y sur).

Fuente: Análisis realizado del modelo GFS en el Inst. de Clima y Agua.


PRONÓSTICO de temperaturas máximas

15


Jueves 2




Viernes 3




Sábado 4




Domingo 5



Lunes 6




Martes 7



Ascenso de las temperaturas hasta el domingo 5.
Ambiente templado a cálido; se podrían superar los 38 °C en
el extremo norte del país.

Temperaturas estimadas a 2m del suelo.

Fuente: análisis realizado en el Inst. de Clima y Agua-INTA a partir del modelo GFS.




Mapas de temperatura máxima
diarias pronosticadas


PRONÓSTICO de temperaturas mínimas

16


Jueves 2




Viernes 3




Sábado 4




Domingo 5



Lunes 6




Martes 7



Descenso de las temperaturas a partir del domingo 5.
Mínimas frescas a templadas en el centro argentino.


Temperaturas estimadas a 2m del suelo.
Fuente: análisis realizado en el Inst. de Clima y Agua-INTA a partir del modelo GFS.




Mapas de temperatura mínima
diarias pronosticadas

<http://siga.inta.gob.ar/#/forecast>


Jueves 2




Viernes 3




Sábado 4




Domingo 5



Lunes 6



Martes 7




Heladas agronómicas (menores a 3 °C) en prov. de Bs. As.
Heladas débiles a moderadas en la Patagonia
(menores a -3 °C).

Temperaturas estimadas a 2m del suelo. Los valores en superficie podrían ser significativamente diferentes dependiendo de la orografía local.




Mapas de intensidad de
heladas diarias pronosticadas.


Jueves 2




Viernes 3






Sábado 4



Domingo 5




Lunes 6



Los ovinos recién esquilados y los neonatales son sensibles a las bajas temperaturas, al viento y a las precipitaciones. Pueden sufrir el síndrome hipotermia-inanición que determina una alta mortalidad en la majada. El índice de enfriamiento en ovinos se utiliza para determinar el riesgo de ocurrencia de este síndrome. Para el cálculo de este índice se utiliza la velocidad del viento, la temperatura ambiente y las precipitaciones previstas. Valores del índice superiores a 1000 kJ/m².h determinan riesgos de enfriamiento.

El pronóstico del índice busca orientar el manejo para disminuir los riesgos de ocurrencia del síndrome. Para su tratamiento se utilizan, entre otras estrategias, el suministro de reparos o la suplementación con alimentos energéticos.

TRIMESTRE: octubre – noviembre – diciembre de 2025




Pronóstico trimestral para precipitación

Precipitaciones:

Para el próximo trimestre se prevé una mayor probabilidad de lluvias inferiores a lo normal en las provincias del Litoral y en el noroeste de la Patagonia.

Hacia el noroeste del país, son mayores las probabilidades de transitar un trimestre con lluvias mayores a las normales para la época.

En el resto del territorio este trimestre se presentaría con lluvias normales.




Pronóstico trimestral para temperaturas medias

Temperaturas medias:

Para el próximo trimestre se prevén valores superiores a lo habitual en gran parte del territorio nacional. Las probabilidades de ocurrencia son mayores al 50% en las provincias del centro del país, en especial en Córdoba.

En las provincias del noroeste las temperaturas resultarían normales para la época.


Actualizado: 26/9/2025




Probabilidad de ocurrencia de cada fase del fenómeno ENSO a partir de los modelos de **pronóstico internacionales**.

Estado actual del ENSO: **NEUTRAL con transición a La Niña**.

Actualmente el estado es Neutral. Para los próximos meses se proyecta una transición hacia La Niña, con un 60% de probabilidad de ocurrencia entre octubre y diciembre. Este evento sería de corta duración, seguido por un retorno a condiciones de ENSO Neutral hacia el verano-otoño.






Valores pronosticados del índice IOD.

Estado actual del DOI: **Negativo**

Durante la primavera se monitorean también las temperaturas y los vientos en el Océano Índico, dado que en esta época del año este indicador influye en las precipitaciones de nuestro país, especialmente en la región este.



El pronóstico indica que este indicador se mantendría en valores negativos hasta diciembre/25. Esta condición de este fenómeno podría favorecer la ocurrencia de lluvias por debajo de lo normal en el este y noreste del país durante la primavera.

PRECIPITACIONES

Lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro-este y noreste del país. Algunas podrían ser con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo. Lluvias y nevadas aisladas en la Patagonia (centro y sur).

TEMPERATURAS

Ascenso de las temperaturas; se podrían alcanzar los 38 °C en el extremo norte del país. Descenso de las temperaturas a partir del domingo 5; hasta el martes 7 hay probabilidad de algunas heladas agronómicas (menores a 3 °C) en prov. de Bs. As. Heladas débiles a moderadas en la Patagonia.

ENSO

El fenómeno se encuentra en su fase Neutral con una posible transición a La Niña en los próximos meses y un retorno a condiciones neutrales hacia el verano-otoño.

Se recomienda consultar la actualización mensual de este pronóstico y los trimestrales para conocer el posible comportamiento de las lluvias y las temperaturas.

FUENTES



Red AgroMet

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
- Facultad de Agronomía (FAUBA).
- Dirección de Estimaciones Agrícolas (DEA) – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Modelo Meteorológico GFS del COLA-IGES, USA.
- CPC-NCEP/NOAA, IRI.